

## BIÓPSIA DE PRÓSTATA COM SEDAÇÃO

### UNIDADE MATRIZ

R. Aurélio Gatti, 44 - Esplanada - Colatina/ES, 29702-120.  
(27) 3722-4048 | 3722-5342

**MARCAÇÃO DE EXAMES PELO WHATSAPP - 27 99686-6158**

- **TRAZER DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO;**
- **RECOMENDADO O USO DE MÁSCARA;**
- **FIQUE ATENTO AO DIA E HORÁRIO DO SEU EXAME;**

#### **OBS:**

- Remédios de uso habitual como para controlar a pressão, o diabetes, entre outros devem ser tomados normalmente.
- Suspenda o AAS (**Aspirina, Melhoral, Bufferin**), Clopidogrel (**Plavix**), Ticlopidina (**Ticlid**) e outros anticoagulantes por mais 10 (dez) dias, devido ao risco de hemorragia, a partir de hoje (caso faça uso diariamente destes). A suspensão destes anticoagulantes deve ser realizada sob orientação do médico que indicou e por mais 07 (sete) dias após a realização da biópsia (**sempre consultar seu médico antes do procedimento**). **Manter as demais medicações de uso diário exceto anti-inflamatórios e anti-coagulantes.**
- Informar caso o paciente seja portador de alguma doença.
- Pacientes do Convênio **UNIMED** deverão trazer guia do procedimento já autorizado.

**VÉSPERA DO EXAME:** \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ às \_\_\_\_\_.

- Às 19 horas, tomar 01 comprimido de **CiproFloxacina 500mg**.

**DIA DO EXAME:** \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ às \_\_\_\_\_.

- Tomar 01 comprimido de **CiproFloxacina 500mg** (02 horas) antes do exame.
- **Continuar Tomando durante 06 dias após a realização do exame de 12/12 horas.**
- Tomar 01 comprimido de Metronidazol 400mg (03 horas) antes do exame.
- **Continuar tomando durante 05 dias após a realização do exame de 8/8 horas.**
- **Jejum de 08 horas.**
- **Não ingerir líquido (se for tomar alguma medicação inserir somente 20ml de água).**
- **Não ingerir bebida alcoólica 5 dias antes do procedimento e 5 dias após o procedimento.**
- Será administrado pela Clínica, ao término do procedimento, uso endovenoso do medicamento **Rocefin 1g** (que será realizado exclusivamente pelo médico).
- Tomar 01 comprimido de **Dipirona 1g**, 08 horas após o procedimento e realizar o uso de 8/8 horas, caso necessário.
- Chegar 20 minutos antes do horário marcado.

**TRAZER ACOMPANHANTE (APÓS A REALIZAÇÃO DO EXAME O PACIENTE NÃO PODERÁ DIRIGIR, ANDAR DE MOTO OU REALIZAR OUTRAS ATIVIDADES).**